Dog Attacks Stats & Facts - Spanish



HECHOS

- 1. Cualquier perro puede morder: grande o pequeño, macho o hembra, joven o viejo. Incluso la mascota más mimosa, peluda y dulce puede morder si se le provoca. Recuerde que no es la raza de un perro lo que determina si morderá, sino la historia y el comportamiento individual del perro.
- 2. La mayoría de las mordeduras de perro necesitan atención médica inmediata y tratamiento de urgencia. La mayoría de las víctimas de mordeduras son niños. La mayoría de las víctimas humanas son mutiladas o mordidas en la cara.
- 3. Forbes investigó el tema y descubrió que hay diferencias significativas según la raza. Las razas de perros generalmente consideradas agresivas, como el Pit Bull y el Rottweiler, encabezaban el riesgo de sufrir lesiones graves o incluso la muerte.
- 4. El estudio de los CDC descubrió que el Pit Bull tenía más probabilidades de morder que otras razas. En este caso, la raza fue responsable de 60 incidentes destacados.
- 5. El segundo fue el Rottweiler con 29 y el Pastor Alemán con 19. Los Pit Bulls representan sólo el 6,5% de todos los perros de Estados Unidos. Sin embargo, la raza es responsable del 66% de todas las muertes por mordedura de perro.
- 6. En las listas de Forbes de la mayoría de las muertes causadas por razas de perros:

Pitbull: 284Rottweiler 45Pastor alemán: 20

• Mestizo: 17

Bulldog americano 15Mastín o Bullmastiff 14

• Husky: 13

• Labrador Retriever: 9

• Bóxer: 7

• Doberman Pinscher: 6

ESTADÍSTICAS

- Las mordeduras de perro provocan aproximadamente 44.000 lesiones faciales cada año. Los niños constituyen el 60% de las víctimas de mordeduras de perro. En los niños menores de diez años se producen casi exclusivamente lesiones graves.
- El objetivo más frecuente es la cara (77% de todas las víctimas). El 97% de los ataques a carteros se producen en las extremidades inferiores, como las piernas o los pies. La estancia media de los heridos graves es de 4,2 días. Las

mordeduras de perro provocan 18 muertes al año.

- Según las estadísticas de lesiones por mordedura de perro de los CDC, cada 40 segundos alguien en Estados Unidos debe recibir atención médica por una mordedura de perro. Al menos 800.000 personas reciben mordeduras de perro o de animales domésticos cada año en EE.UU.
- El 43% de las personas hospitalizadas por mordeduras de perro requirieron tratamiento por infección de la piel y de los tejidos subyacentes; el 22% tenían heridas en las piernas o los brazos; el 10,5% tenían heridas en la cabeza, el cuello y el torso; y el resto de los pacientes tenían problemas que iban desde la fractura de los huesos hasta el envenenamiento de la sangre.
- El 81% de las mordeduras de perro no causan ninguna herida o sólo heridas leves que no requieren atención médica
- Hay una probabilidad de 1 entre 112.400 de morir por una mordedura o golpe de perro