
Lead Paint Dangers and Safety Stats & Facts — Spanish



HECHOS

- 1. La exposición al plomo puede dañar a los niños pequeños y a los bebés incluso antes de que nazcan.
- 2. Incluso los niños que parecen sanos pueden tener altos niveles de plomo en su cuerpo.
- 3. El plomo se puede introducir en el cuerpo al respirar o ingerir polvo de plomo, o al comer tierra o trozos de pintura que contengan plomo.
- 4. En la mayoría de los casos, la pintura con plomo que está en buen estado no es un peligro.
- 5. Eliminar la pintura con base de plomo de forma inadecuada puede aumentar el peligro para su familia.
- 6. El plomo es aún más peligroso para los niños que para los adultos porque:
 - Los bebés y los niños pequeños se llevan a menudo las manos y otros objetos a la boca. Estos objetos pueden tener polvo de plomo;
 - El cuerpo en crecimiento de los niños puede absorber más plomo; y
 - El cerebro y el sistema nervioso central de los niños son más sensibles a los efectos nocivos del plomo.

ESTADÍSTICAS

- Según los (CDC), se calcula que unos 250.000 niños estadounidenses tienen niveles de plomo en sangre lo suficientemente altos como para causar daños importantes a su salud. Las principales fuentes de exposición al plomo entre los niños estadounidenses son el plomo.
- La OSHA calcula que 804.000 trabajadores de la industria general y otros 838.000 trabajadores de la construcción están potencialmente expuestos al plomo.
- Cada 30 segundos muere un trabajador por exposición a tóxicos en su lugar de trabajo. Cada 15 segundos muere un trabajador por condiciones de trabajo peligrosas en general.
- Alrededor de 2,8 millones de trabajadores mueren al año en todo el mundo por condiciones de trabajo inseguras o insalubres.
- Las enfermedades derivadas de los lugares de trabajo -como el cáncer de pulmón vinculado a la inhalación de sustancias cancerígenas en el trabajo- representan alrededor del 86% de todas las muertes prematuras.
- El cáncer es, con mucho, la causa más importante de las muertes, ya que representa aproximadamente el 70% de las enfermedades laborales.